YUKAER SEEDS

PORTFÓLIO DE SOJA 26/27



LANÇAMENTO

neo550 I2X

INTACTA 2 XTEND

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Precocidade e alto Peso de Mil Grãos (PMG)
- Cultivar desenvolvida para o Sul de MG

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
5.5	204g	BAIXO	5

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO (Preferencial / Tolerada)	CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	OUT	NOV	DEZ	JAN	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
		01 05 10 15 20 25	**01** 05 10 15 20 25	**01** 05 10 15 20 25	**01** 05 10 15 20 25 **30**	
302 MG Sul	115					280 - 320 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.



LANÇAMENTO

neo780 CE

Conkesta E3 SOJA Enlist

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Ampla adaptação
- Estabilidade produtiva e flexibilidade de manejo
- Resistente a Nematoide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
7.5 M3 7.8 M4	158g	MÉDIO	4 M4 · 5 M3

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO (Preferencial / Tolerada)		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
301	GO Sudoeste	116	260 - 320 mil
	MS Norte	116	240 - 320 mil
302	GO Sudoeste e Sul	112	260 - 320 mil
	MG Pontal	120	220 - 280 mil
	SP Norte	120	220 - 280 mil
303	GO Centro Sul	120	220 - 300 mil
	MG Alto Paranaíba	120	220 - 280 mil
	MG Triângulo	120	220 - 280 mil
304	DF (irrigado)	116	250 - 300 mil
	DF (sequeiro)	116	260 - 320 mil
	GO Leste (irrigado)	116	250 - 300 mil
	GO Leste (sequeiro)	116	260 - 320 mil
	MG Noroeste (irrigado)	116	250 - 300 mil
	MG Noroeste (sequeiro)	116	260 - 320 mil
401	MT Sul	113	280 - 320 mil
402	MT Médio-Norte	109	280 - 350 mil
	MT Oeste	111	280 - 350 mil
403	MT Vale do Araguaia	109	280 - 350 mil



[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. O evento de soja transgênica em Enlist E3® e Conkesta E3® é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences L.L.C. e da M.S. Technologies, L.L.C. Enlist E3® e Conkesta E3® são marcas registradas da Dow AgroSciences L.L.C..

LANÇAMENTO

neo791 CE

Conkesta E3 SOJA Enlist

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Excelente pacote sanitário
- Resistente a Nematoide de Cisto Raças 3 e 6
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 9, 10, 14 e 14+

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
7.9	163 g	MÉDIO	4

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO



[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. O evento de soja transgênica em Enlist E3® e Conkesta E3® é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences L.L.C. e da M.S. Technologies, L.L.C. Enlist E3® e Conkesta E3® são marcas registradas da Dow AgroSciences L.L.C..

LANÇAMENTO

neo811 I2X

INTACTA 2 XTEND

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Porte e ciclo adaptados à Bahia
- Resistente a Nematoide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+
- Mod. Resistente a *Meloidogyne incognita*

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE	TOLERANTE A SULFONILUREIAS STS™ [4]
8.1	178g	ALTO	4	SIM

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO	CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	OUT	NOV	DEZ	JAN	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
Preferencial / Tolerada		01 05 10 15 20 25	01 05 10 15 20 25	01 05 10 15 20 25	01 05 10 15 20 25 30	
405 BA Oeste (irrigado)	122					160 - 220 mil
BA Oeste (sequeiro)	116					180 - 260 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. "STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.



LANÇAMENTO

neo821 I2X

INTACTA 2 XTEND

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Performance produtiva
- Excelente desenvolvimento inicial aliado ao porte equilibrado em condição de médio potencial produtivo

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
7.9 405 8.2 404 e 501	177g	MÉDIO	3 (404 e 501) 4 (405)

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO — Preferencial / Tolerada

		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
404	TO Sul	112	200 - 280 mil
405	BA Oeste (irrigado)	118	160 - 220 mil
	BA Oeste (sequeiro)	111	180 - 260 mil
501	MA Batavo	108	200 - 280 mil
	MA Sul	110	220 - 300 mil
	PA Sul	112	200 - 280 mil
	PI Sul	112	220 - 300 mil
	TO Campos Lindos	112	200 - 280 mil
	TO Norte	110	220 - 300 mil



[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

neo640 I2X

INTACTA 2 XTEND

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Precocidade
- Porte controlado
- Boa arquitetura de planta
- Amplia a janela de plantio da 2ª safra
- Resistente ao acamamento

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
5.7 302 MG Sul 6.4 M3	180g	BAIXO	5

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO (■ Preferencial ■ Tolerada)		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	OUT 01 05 10 15 20 25	NOV 01 05 10 15 20 25	DEZ 01 05 10 15 20 25	JAN 01 05 10 15 20 25 30	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
302	MG Pontal	104					280 - 350 mil
	MG Sul	117					250 - 300 mil
	SP Norte	104					280 - 350 mil
303	MG Alto Paranaíba	104					280 - 350 mil
	MG Triângulo	104					280 - 350 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

neo690 I2X

INTACTA 2 XTEND

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Amplia a janela de plantio da 2ª safra
- Boa arquitetura de planta
- Resistente a Nematoide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 6, 10, 14 e 14+

GRUPO DE MATURAÇÃO

6.9 M3 e 405 7.1 M4

PESO DE MIL GRÃOS

175g

POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

MÉDIO

EXIGÊNCIA À FERTILIDADE

5

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO (■ Preferencial ■ Tolerada)		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
301	GO Sudoeste	104	300 - 380 mil
	MS Norte	104	300 - 380 mil
302	GO Sudoeste e Sul	101	300 - 380 mil
	MG Pontal	111	260 - 320 mil
	MG Sul	128	240 - 280 mil
	SP Norte	111	260 - 320 mil
303	GO Centro Sul	111	260 - 320 mil
	MG Alto Paranaíba	111	260 - 320 mil
	MG Triângulo	111	260 - 320 mil
304	DF (irrigado)	105	280 - 340 mil
	DF (sequeiro)	105	300 - 380 mil
	GO Leste (irrigado)	105	280 - 340 mil
	GO Leste (sequeiro)	105	300 - 380 mil
	MG Noroeste (irrigado)	105	280 - 340 mil
	MG Noroeste (sequeiro)	105	300 - 380 mil
401	MT Sul	102	350 - 400 mil
402	MT Médio-Norte	95	350 - 400 mil
	MT Oeste	95	350 - 400 mil
405	BA Oeste (irrigado)	103	320 - 380 mil



[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

neo700 I2X

INTACTA 2 XTEND

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Precocidade
- Cultivar precoce que permite abertura de semeadura
- Resistente a Nematoide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE	TOLERANTE A SULFONILUREIAS STS™ [4]
7.0 M3 7.1 M4	176g	MÉDIO	5	SIM

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
		OUT: 01 05 10 15 20 25 · NOV: 01 05 10 15 20 25 · DEZ: 01 05 10 15 20 25 · JAN: 01 05 10 15 20 25 30	
301	GO Sudoeste	105	260 - 320 mil
	MS Norte	105	240 - 320 mil
302	GO Sudoeste e Sul	102	260 - 320 mil
	MG Pontal	111	220 - 260 mil
	MG Sul	127	200 - 260 mil
	SP Norte	111	220 - 260 mil
303	GO Centro Sul	111	220 - 300 mil
	MG Alto Paranaíba	111	220 - 280 mil
	MG Triângulo	111	220 - 280 mil
304	DF (irrigado)	104	240 - 300 mil
	DF (sequeiro)	104	260 - 320 mil
	GO Leste (irrigado)	104	240 - 300 mil
	GO Leste (sequeiro)	104	260 - 320 mil
	MG Noroeste (irrigado)	104	240 - 300 mil
	MG Noroeste (sequeiro)	104	260 - 320 mil
401	MT Sul	101	320 - 360 mil
405	BA Oeste (irrigado)	102	320 - 380 mil

■ Preferencial ■ Tolerada

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. [4]STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.

neo760 CE

YUKAER SEEDS

Conkesta E3 SOJA Enlist

PONTOS FORTES

- Resistente a Nematoide de Cisto Raças 3, 9 e 14
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 6, 10 e 14+

GRUPO DE MATURAÇÃO
7.4 M5 7.5 M3 7.6 M4

PESO DE MIL GRÃOS
161 g

POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO
BAIXO

EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
4 M4 5 M3 e M5

TOLERANTE A SULFONILUREIAS STS™ [5]
SIM

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
Preferencial / Tolerada			
301	GO Sudoeste	116	250 - 320 mil
	MS Norte	116	250 - 320 mil
302	GO Sudoeste e Sul	110	250 - 320 mil
	MG Pontal	120	240 - 280 mil
	SP Norte	120	240 - 280 mil
303	GO Centro Sul	120	240 - 280 mil
	MG Alto Paranaíba	120	240 - 280 mil
	MG Triângulo	120	240 - 280 mil
304	DF (irrigado)	109	250 - 300 mil
	DF (sequeiro)	109	250 - 320 mil
	GO Leste (irrigado)	109	250 - 300 mil
	GO Leste (sequeiro)	109	250 - 320 mil
	MG Noroeste (irrigado)	109	250 - 300 mil
	MG Noroeste (sequeiro)	109	250 - 320 mil
401	GO Centro-Oeste	110	250 - 350 mil
404	GO Norte	108	250 - 320 mil
401	MT Sul	105	300 - 380 mil
402	MT Médio-Norte	101	320 - 380 mil
	MT Oeste	100	320 - 380 mil
	RO (abaixo de 400m)	105	250 - 320 mil
	RO (acima de 400m)	105	320 - 380 mil
403	MT Vale do Araguaia	105	320 - 380 mil
404[4]	TO Transição	101	280 - 350 mil
405	BA Oeste (irrigado)	106	300 - 380 mil
501[4]	MA Batavo	98	300 - 380 mil
	PA Sul	101	280 - 350 mil
	TO Campos Lindos	98	300 - 380 mil
	TO Transição	101	280 - 350 mil
502	PA Norte	97	320 - 400 mil



[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. [4]Pontos importantes para cultivo na região da transição da Micro 404 TO/Micro 501 TO e no Estado do Pará: a partir do 5º ano de cultivo de soja; áreas de alta fertilidade; não plantar em áreas de cascalho; plantio com chuvas consolidadas. [5]STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras. O evento de soja transgênica em Enlist E3® e Conkesta E3® é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences L.L.C. e da M.S. Technologies, L.L.C. Enlist E3® e Conkesta E3® são marcas registradas da Dow AgroSciences L.L.C..

neo761 I2X

INTACTA 2 XTEND

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Altamente responsiva à época de plantio e população
- Amplia a janela de plantio da 2ª safra
- Resistente a Nematoide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
7.3 M3 7.6 M4	186g	BAIXO	5

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO (■ Preferencial ■ Tolerada)		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
301	GO Sudoeste	111	280 - 320 mil
	MS Norte	111	260 - 320 mil
302	GO Sudoeste e Sul	103	280 - 320 mil
	MG Pontal	114	220 - 280 mil
	SP Norte	114	220 - 280 mil
303	GO Centro Sul	114	220 - 280 mil
	MG Alto Paranaíba	114	220 - 280 mil
	MG Triângulo	114	220 - 280 mil
304	DF (irrigado)	108	240 - 300 mil
	DF (sequeiro)	108	260 - 320 mil
	GO Leste (irrigado)	108	240 - 300 mil
	GO Leste (sequeiro)	108	260 - 320 mil
	MG Noroeste (irrigado)	108	240 - 300 mil
	MG Noroeste (sequeiro)	108	260 - 320 mil
401	GO Centro-Oeste	103	280 - 340 mil
404	GO Norte	103	280 - 340 mil
401	MT Sul	102	300 - 360 mil
402	MT Médio-Norte	99	320 - 360 mil
	MT Oeste	102	320 - 360 mil
	RO (abaixo de 400m)	101	250 - 320 mil
	RO (acima de 400m)	102	320 - 360 mil
403	MT Vale do Araguaia	100	320 - 360 mil



[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

neo771 I2X

YUKAER SEEDS

INTACTA 2 XTEND

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Boa arquitetura de planta
- Resistente a Nematoide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+

GRUPO DE MATURAÇÃO
7.7 M3, M4 e 405 7.8 M5

PESO DE MIL GRÃOS
158g

POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO
BAIXO

EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
4 M4
5 M3 e M5

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
301	GO Sudoeste	118	200 - 280 mil
	MS Norte	118	200 - 280 mil
302	GO Sudoeste e Sul	114	200 - 280 mil
	MG Pontal	122	180 - 240 mil
	SP Norte	122	180 - 240 mil
303	GO Centro Sul	122	180 - 260 mil
	MG Alto Paranaíba	122	180 - 240 mil
	MG Triângulo	122	180 - 240 mil
304	DF (irrigado)	118	180 - 240 mil
	DF (sequeiro)	118	200 - 280 mil
	GO Leste (irrigado)	118	180 - 240 mil
	GO Leste (sequeiro)	118	200 - 280 mil
	MG Noroeste (irrigado)	118	180 - 240 mil
	MG Noroeste (sequeiro)	118	200 - 280 mil
401	GO Centro-Oeste	114	200 - 280 mil
404	GO Norte	114	200 - 280 mil
401	MT Sul	112	280 - 320 mil
402	MT Médio-Norte	105	280 - 320 mil
	MT Oeste	105	280 - 320 mil
	RO (abaixo de 400m)	105	250 - 300 mil
	RO (acima de 400m)	105	280 - 320 mil
403	MT Vale do Araguaia	104	280 - 320 mil
404	TO Sul	108	220 - 300 mil
	TO Transição	105	250 - 320 mil
405	BA Beira da Serra[5]	107	200 - 280 mil
	BA Oeste (irrigado)	113	180 - 240 mil
501	MA Batavo	103	250 - 320 mil
	MA Serra do Penitente	103	280 - 350 mil
	PA Sul	105	250 - 320 mil
	PI Sul[4]	100	280 - 350mil
	TO Campos Lindos	103	250 - 320 mil
	TO Transição	105	250 - 320 mil



Preferencial Tolerada

[1]Ciclo na região de estabelecimento. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. [4]Pontos importantes para cultivo na região do Matopiba: 501 PI: áreas de alta fertilidade evitar antecipação da data de semeadura e plantio de risco (com chuvas não consolidadas) [5]A Região 405 Oeste (Beira da Serra) abrange a microrregião de Barganta, além de partes das microrregiões de Estrondo, Porcas, Bela Vista e Serra de Roda Velha. Suas coordenadas geográficas delimitam a região da seguinte maneira: ao sul, LAT: -13.343059° / LONG: -46.247182° e ao norte, LAT: -11.329394° / LONG: -46.185915°.

neo800 I2X

INTACTA 2 XTEND

YUKAER SEEDS

★ **DESAFIO CESB 2025** 1º lugar Nordeste e 1º lugar Bahia

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Ideal para ambientes de alta tecnologia

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
7.9 405 8.0 M3 e M4	163g	MÉDIO	5

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO (■ Preferencial ■ Tolerada)		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
401	GO Centro-Oeste	117	180 - 240 mil
404	GO Norte	117	180 - 240 mil
401	MT Sul	119	250 - 300 mil
402	MT Médio-Norte	112	250 - 300 mil
	MT Oeste	115	250 - 300 mil
	RO (abaixo de 400m)	117	200 - 280 mil
	RO (acima de 400m)	115	250 - 300 mil
403	MT Vale do Araguaia	112	250 - 300 mil
405	BA Beira da Serra[4]	111	200 - 280 mil
	BA Oeste (irrigado)	118	180 - 240 mil



[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. [4]A Região 405 Oeste (Beira da Serra) abrange a microrregião de Garganta, além de partes das microrregiões de Estrondo, Placas, Bela Vista e Serra de Roda Velha. Suas coordenadas geográficas delimitam a região da seguinte maneira: ao sul, LAT: -13.343059° / LONG: -46.247182°, e ao norte, LAT: -11.320994° / LONG: -46.185815°.



neo801 CE

YUKAER SEEDS

Conkesta E3 SOJA Enlist

PONTOS FORTES

- Boa arquitetura de planta
- Ideal para ambientes de alta tecnologia
- Resistente a Nematoide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+

GRUPO DE MATURAÇÃO	PESO DE MIL GRÃOS	POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA À FERTILIDADE
8.1	156 g	MÉDIO	5

RESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO (■ Preferencial ■ Tolerada)		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	OUT 01 05 10 15 20 25	NOV 01 05 10 15 20 25	DEZ 01 05 10 15 20 25	JAN 01 05 10 15 20 25 30	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
401	MT Sul	117					250 - 320 mil
402	MT Médio-Norte	113					280 - 320 mil
	MT Oeste	113					280 - 320 mil
	RO (abaixo de 400m)	113					220 - 280 mil
	RO (acima de 400m)	113					280 - 320 mil
403	MT Vale do Araguaia	110					280 - 320 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. O evento de soja transgênica em Enlist E3® e Conkesta E3® é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences L.L.C. e da M.S. Technologies, L.L.C. Enlist E3® e Conkesta E3® são marcas registradas da Dow AgroSciences L.L.C..



neo802 I2X

YUKAER SEEDS

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Estabilidade produtiva
- Boa arquitetura de planta
- Porte e ciclo adequados ao Cerrado

INTACTA 2 XTEND

GRUPO DE MATURAÇÃO

7.8 405 7.9 M3 8.0 404 TO, 501 e 502 8.1 M4

PESO DE MIL GRÃOS

178g

POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

MÉDIO

EXIGÊNCIA À FERTILIDADE

4 M3 e M4

5 M5

RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO (Preferencial / Tolerada)		CICLO MÉDIO[1] (dias[2])	POPULAÇÃO[3] (plantas/ha)
301	GO Sudoeste	119	180 - 240 mil
	MS Norte	119	180 - 240 mil
302	GO Sudoeste e Sul	115	180 - 240 mil
	MG Pontal	126	160 - 200 mil
	SP Norte	126	160 - 200 mil
303	GO Centro Sul	126	160 - 220 mil
	MG Alto Paranaíba	126	160 - 200 mil
	MG Triângulo	126	160 - 200 mil
304	DF (irrigado)	119	160 - 200 mil
	DF (sequeiro)	119	180 - 240 mil
	GO Leste (irrigado)	119	160 - 200 mil
	GO Leste (sequeiro)	119	180 - 240 mil
	MG Noroeste (irrigado)	119	160 - 200 mil
	MG Noroeste (sequeiro)	119	180 - 240 mil
401	GO Centro-Oeste	115	180 - 260 mil
404	GO Norte	115	180 - 260 mil
401	MT Sul	119	200 - 280 mil
402	MT Médio-Norte	111	220 - 300 mil
	MT Oeste	113	220 - 300 mil
403	MT Vale do Araguaia	112	220 - 300 mil
404	TO Sul	110	220 - 300 mil
405	BA Beira da Serra[5]	109	200 - 280 mil
	BA Oeste (irrigado)	118	180 - 240 mil
501	MA Batavo[4]	108	250 - 320 mil
	MA Sul[4]	105	250 - 350 mil
	PA Sul[4]	110	220 - 300 mil
	PI Sul[4]	106	250 - 350 mil
	TO Campos Lindos	108	250 - 320 mil
	TO Norte	107	250 - 320 mil
502	PA Norte	105	250 - 320 mil



[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. [4]Pontos importantes para cultivo na região da Micro 501 MA e PI: áreas de alta fertilidade; evitar antecipação da data de semeadura e plantio de risco (com chuvas não consolidadas). [5]A Região 405 Oeste (Beira da Serra) abrange a microrregião de Barganta, além de partes das microrregiões de Estrondo, Placas, Bela Vista e Serra de Roda Velha. Suas coordenadas geográficas delimitam a região da seguinte maneira: ao sul, LAT.: -13.343059° / LONG: -46.247182°, e ao norte, LAT.: -11.321099° / LONG: -46.185815°.

Tratamento de Sementes Industrial (TSI):

Para alcançar uma lavoura uniforme, com o estande perfeito e menos gastos operacionais, o Tratamento de Sementes Industrial (TSI) é o primeiro passo para o sucesso da safra. Mais do que uma simples proteção inicial, o TSI consiste na aplicação cirúrgica de uma calda composta por inseticidas, fungicidas e soluções biológicas. O objetivo é claro: entregar a dose exata de proteção para que a planta enfrente os desafios do campo e expresse seu máximo potencial genético logo na largada.



O Padrão Yukaer Seeds de Excelência

Na Yukaer Seeds, a tecnologia de ponta trabalha a favor do seu investimento. Nosso centro de TSI conta com maquinário de última geração desenhado para realizar o tratamento individualizado de cada semente, assegurando uma cobertura perfeita e uniforme, sem desperdícios.

Esse rigoroso controle de qualidade mantém a integridade física e fisiológica dos grãos. O resultado não poderia ser outro: sementes robustas, prontas para um arranque vigoroso e preparadas para entregar resultados expressivos na produtividade final da sua colheita.

CORTEVA™ agriscience

TSI YUKAER SEEDS

LANÇAMENTO RECEITA COMPLETA

As soluções de SAT são pensadas para as demandas do produtor, e a combinação de nossos produtos potencializa os resultados no campo de forma única.

SAT = POWER

Dermacor®
TRATAMENTO DE SEMENTES
INSETICIDA

- Excelente manutenção do estande
- Rápido estabelecimento da cultura
- Controle das principais pragas de solo e foliares iniciais

NOVO
LumiTreo®
TRATAMENTO DE SEMENTES
FUNGICIDA

- Moléculas inovadoras em TS
- Excelente controle de doenças iniciais na soja
- Melhor estabelecimento de plantas
- Ação de contato e sistêmica
- Distribuição uniforme

SAT = POWER PLUS

Dermacor®
TRATAMENTO DE SEMENTES
INSETICIDA

- Excelente manutenção do estande
- Rápido estabelecimento da cultura
- Controle das principais pragas de solo e foliares iniciais

NOVO
LumiTreo®
TRATAMENTO DE SEMENTES
FUNGICIDA

- Moléculas inovadoras em TS
- Excelente controle de doenças iniciais na soja
- Melhor estabelecimento de plantas
- Ação de contato e sistêmica
- Distribuição uniforme

Lumialza™
TRATAMENTO DE SEMENTES
NEMATICIDA

- Raízes mais fortes e restauração do solo
- Maior crescimento e produtividade

CORTEVA™

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br

™® Marcas registradas da Corteva Agriscience e suas companhias afiliadas. © 2025 Corteva

TSI YUKAER SEEDS

syngenta

Fortenza™	Inseticida com amplo espectro, controlando pragas iniciais, como lagarta-rosca, elasmo e spodoptera com habito de rosca proporcionando proteção de estande. Oferta com fungicida Maxim Quattro
Fortenza™ Duo	Combinação de dois inseticidas (Fortenza e Cruiser) que controlam o ataque de pragas abaixo e acima do solo tais como lagartas, percevejos, vaquinhas, torrãozinho preservando estande e área foliar, além do efeito bioativador e enraizador de Cruiser. Oferta com fungicida Maxim Quattro
Fortenza® Elite	Tripla Proteção na fase inicial de estabelecimento contra pragas desfolhadoras (Vaquinha, Torrãozinho, percevejo), lagartas e Nematóides sendo composto por Fortenza, Cruiser e Avicta. Oferta com fungicida Maxim Quattro
Fortenza™ Duo + Victrato® TYMIRIUM® technology	VICTRATO atua desde a germinação, protegendo as raízes contra nematoides e patógenos de solo e, pela mobilidade na planta, garante defesa contra doenças foliares iniciais. Oferta composta por Fortenza Duo, Victrato e Maxim Quattro.
Arvatico®	Bionematicida e biofungicida que proporciona energia e proteção para a lavoura. Com uma formulação inovadora, ARVATICO promove o crescimento e fortalece as raízes das plantas contra nematoides e doenças iniciais, protegendo a lavoura por mais tempo.
Rizoliq® LLI	Com tecnologia longa-vida RIZOLIQ® LLI é inoculante para o Tratamento de Sementes Industrial para potencializar a fixação biológica de Nitrogênio (FBN) na lavoura desde a semeadura, com eficácia, conveniência e flexibilidade para a soja
Maxim® Quattro	Fungicida presente em todas ofertas Seedcare, destacando pela sinergia de 4 igredientes ativos, oferecendo amplo spectro de controle de fungos, elevando o potencial produtivo

Anotação:

YUKAER SEEDS

@yukaerseeds

Pedrinópolis, MG

(34) 99842-8225

